

Responsabilidad SOCIAL

Gilead lucha contra la leishmaniasis visceral...

La biofarmacéutica de origen estadounidense Gilead, que se dedica al desarrollo de medicamentos innovadores en el área cardiovascular y de enfermedades infecciosas...

de infección se encuentra en el sur de Asia, en el cuerno de África y en el subcontinente indio. Su índice de mortalidad se acercaría al cien por cien.

Texto: REDACCIÓN

PREMIOS & BECAS

Investigación biomédica La Fundación Lilly ha abierto el plazo de convocatoria de la XI edición de los Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica...

respectivamente. Los candidatos, que deben desarrollar su actividad investigadora en España y haber contribuido de forma destacada al desarrollo de la Biomedicina...

...Y Merck dobla la suya contra la esquistosomiasis

La compañía farmacéutica alemana Merck ha anunciado que va a duplicar sus donaciones de praziquantel para el tratamiento de esquistosomiasis en el continente africano...

La esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria crónica causada por gusanos y podría haber 700 millones de personas en riesgo de infectarse...

Texto: REDACCIÓN

febrero de 2012. El Jurado está integrado por el Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly...

logía e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid); María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas...

agenda

Del 25 al 28 de enero Conferencia de Reumatología

Se celebra en Madrid la conferencia Excellence in Rheumatology (EiR), en la que se debatirán los últimos hallazgos científicos en Reumatología y se ofrecerán las claves para su traslación a la práctica clínica...

Farmacia & Industria

Es un suplemento mensual de CORREO FARMACÉUTICO

DIRECTOR

Francisco J. Fernández.

PUBLICIDAD

Director Comercial:

Jesús Zaballa

Directora de Publicidad Área de Salud:

Mar de Vicente

Directora de Publicidad:

Belén Pérez (belen.perez@unidadeditorial.es)

Tf. 91 443 54 10

Key Account Manager :

Daniel de Julián (danieldejulian@unidadeditorial.es)

Tf. 91443 55 02

Madrid

Eusebio Eisman (eusebio.eisman@unidadeditorial.es)

Tf. 91 443 54 52

María Gallardo (maria.gallardo@unidadeditorial.es)

Tf. 91443 55 03

María José García (mariaj.garcia@unidadeditorial.es)

Tf. 91 443 54 92 Alicia López (alicia.lopez@unidadeditorial.es) Tf. 91 443 55 01 Marta Arroyo Alegre (marta.alegre@unidadeditorial.es) Tf. 91 443 55 49 Fátima Zornoza (fatima.zornoza@unidadeditorial.es) Tf. 91 443 55 06 Barcelona Tina Pamplona (tina.pamplona@unidadeditorial.es) Tf. 93 496 24 40 Rosa Cores (rosacores@unidadeditorial.es) Tf. 93 496 24 23 Susana Nocete (susana.nocete@unidadeditorial.es) Tf. 93 496 24 50 DIRECTORA DE MARKETING Rosario Serrano (marichalar@unidadeditorial.es) Tf. 91 443 54 91

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO cinfatos descongestivo solución oral

2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada ml contiene: dextrometorano hidrobromuro 2 mg, pseudoefedrina hidrocloreto 6 mg, triprolidina hidrocloreto 0,25 mg...

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral. Se presenta como una solución oral transparente, incolora y con aroma a naranja.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas Tratamiento sintomático de las formas improductivas de tos (tos irritativa, tos nerviosa) acompañadas de congestión nasal, asociadas a resfriado común y gripe. 4.2 Posología y forma de administración Posología: Adultos y mayores de 12 años...

pasados al menos 14 días del tratamiento con alguno de estos medicamentos. Depresores del SNC incluyendo psicotrónicos, antihistamínicos, o medicamentos antiparkinsonianos: posible potenciación de los efectos depresores sobre el SNC. Expectores y mucolíticos...

del sueño, ansiedad, temblor muscular. Trastornos gastrointestinales: distorsión del gusto. Con menor frecuencia: Trastornos del sistema nervioso: hiperactividad, hiperexcitabilidad, mareo y vértigo, dolor de cabeza, ataxia, temblor, somnolencia. Trastornos oculares: dilatación de las pupilas. Trastornos cardíacos: taquicardia, palpaciones, hipertensión, principalmente en pacientes hipertensos. Trastornos gastrointestinales: náuseas, vómitos...

5. DATOS FARMACÉUTICOS 5.1 Lista de excipientes Ácido cítrico monohidrato (E-330), benzoato sódico (E-211), sorbitol líquido (E-420), sacarina sódica (E-954), ciclamato sódico, aroma de naranja y agua purificada. 5.2 Incompatibilidades No procede. 5.3 Período de validez 2 años. Una vez abierto el envase: 18 meses. 5.4 Precauciones especiales de conservación No requiere condiciones especiales de conservación. 5.5 Naturaleza y contenido del envase Frasco de vidrio hidrófilo clase III de color topacio provisto de cápsula cilíndrica de aluminio blanco barnizado en el interior con cierre de espuma de polietileno de baja densidad. Cada envase contiene 125 ml ó 200 ml de solución oral, e incluye un vaso dosificador graduado con medidas cada 2,5 ml hasta 15 ml. 5.6 Precauciones especiales de eliminación La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.